

สถานการณ์การใช้ยาในทางที่ผิดในวัยรุ่น



ยาแก้แพ้

ยาแก้ปวด Tramadol

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

ยาแก้แพ้ เป็นกลุ่มยาที่พบว่ามีการใช้ยาในทางที่ผิดในวัยรุ่น โดยหวังนำผลข้างเคียงของยามาใช้เพื่อผ่อนคลาย เพื่อความบันเทิง ทำให้เคลิบเคลิ้ม เคลิ้มฝัน เกิดการหลอนประสาท

ยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว เช่น trihexyphenidyl, dimenhydrinate, chlorpromazine และยาแก้แพ้รุ่นเก่าที่มีผลข้างเคียงทำให้ง่วงนอน ได้แก่ diphenhydramine, และ chlorpheniramine

ชื่อการค้า Promethazine
API: promethazine

ชื่อการค้า FATEC Syrup
API: cetirizine

ชื่อการค้า MARTEC Syrup
API: cetirizine

ชื่อการค้า CEZA Syrup
API: cetirizine

ชื่อการค้า STARTEC
API: cetirizine



ชื่อการค้า Allergin
API: chlorpheniramine maleate

ชื่อการค้า Unirax
API: hydroxyzine

ชื่อการค้า Datissin
API: Diphenhydramine

ชื่อการค้า CEZA
API: cetirizine hydrochloride

trihexyphenidyl

ของผู้ผลิตรายหนึ่ง ที่วัยรุ่นมักนิยมนำมาใช้กันเพื่อหวังผลให้เกิดฤทธิ์เคลิบเคลิ้ม ฯลฯ ตามที่ต้องการ

สถานการณ์การใช้ยาในทางที่ผิดในวัยรุ่น

ยาแก้แพ้



ยาแก้ปวด Tramadol

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

ترامาดอล (Tramadol) เป็นยาระงับปวด ข้อบ่งใช้รักษาอาการปวดระดับปานกลางถึงรุนแรงชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง เช่น อาการปวดจาก บาดแผล กระดูกหัก การบาดเจ็บของเส้นประสาท ไม่ควรใช้ในอาการปวดเล็กน้อย

การใช้ยา ترامาดอลเกินขนาด พบมากในกลุ่มวัยรุ่นที่นำยามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ในการเสพเพื่อผ่อนคลายและหากใช้ไปนานๆ จะเกิดการเสพติด และทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์ ได้แก่ อารมณ์แปรปรวน มึนงง เคลิ้ม เหงื่อซา

อาการเมื่อใช้ยาเกินขนาด ได้แก่ อาการซึม หมดสติ คลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำ/สูง ชัก หมดสติและอาจอันตรายต่อชีวิตได้

ยา tramadol ยี่ห้อต่างๆ



สถานการณ์การใช้ยาในทางที่ผิดในวัยรุ่น

ยาแก้แพ้

ยาแก้ปวด Tramadol



วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท



ยา clonazepam
เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 4

ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ทำให้
รู้สึกง่วงนอน มึนศีรษะ สับสน จดจำสิ่ง
ต่างๆไม่ได้

โรฮิบโนล (Rohypnol) หรือ flunitrazepam เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 2

ออกฤทธิ์บรรเทาอาการวิตกกังวล ทำให้ออนหลับง่าย สูญเสียความทรง
จำชั่วคราว คลายกล้ามเนื้อ ต้านการชัก และกดระบบการหายใจ ในทางการแพทย์ใช้
เป็นยานอนหลับ ยานำสลบ และสงบประสาทก่อนทำการผ่าตัด ออกฤทธิ์เร็ว

ความผิดเกี่ยวกับการขายยาแผนปัจจุบัน ตาม พรบ.ยา พ.ศ. 2510

มาตรา ๑๒ ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต ขาย หรือนำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบัน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๑๐๑ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีและปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ความผิดเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง

หรือนำผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

มาตรา ๔๔ ห้ามผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง หรือนำผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๕ (๕)

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๔๔ ต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

(๑) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท

(๒) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท

(๓) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท



tramadal
ยาตามาดอล





Diphenhydramine





✓ tw :dopeboyz
✓ IDไลน์: @963jjmwb

แอลเอจิน



Chlorpheniramine



hydroxyzine



cetirizine



trihexyphenidyl hydrochloride



promathazine



ประมวลกฎหมาย

ยาเสพติด

พ.ศ. 2564

ประเด็นการแพร่กระจายของวัตถุออกฤทธิ์ในวัยรุ่นตำบลลาดใหญ่

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2565

มาตรา ๑ ในประมวลกฎหมายนี้

“**ยาเสพติด**” หมายความว่า ยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ หรือสารระเหย

- “**ยาเสพติดให้โทษ**” หมายความว่า สารเคมี พืช หรือวัตถุนิติใด ๆ ซึ่งเมื่อเสพแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นลำดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง กับให้รวมถึงสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงยาสามัญประจำบ้านบางตำรับที่มียาเสพติดให้โทษผสมอยู่ตามกฎหมายว่าด้วยยา
- “**วัตถุออกฤทธิ์**” หมายความว่า วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นสิ่งธรรมชาติหรือที่ได้จากสิ่งธรรมชาติ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทที่เป็นวัตถุสังเคราะห์
- “**สารระเหย**” หมายความว่า สารเคมีหรือผลิตภัณฑ์ที่อาจนำไปใช้เพื่อสนองความต้องการของร่างกายหรือจิตใจซึ่งทำให้สุขภาพโดยทั่วไปทรุดโทรมลง

กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่

พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด พ.ศ. 2564

มี 24 มาตรา
บังคับใช้ 9 พ.ย. 2564

ประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด พ.ศ. 2564

มี 186 มาตรา
บังคับใช้ 9 ธ.ค. 2564
แบ่งเป็น 3 ภาค

ภาค 1 การป้องกันปราบปราม
และควบคุมยาเสพติด

ภาค 2 การบำบัดรักษา
และการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติดยาเสพติด

ภาค 3 บทกำหนดโทษ

พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

มี 10 มาตรา
บังคับใช้ 9 ธ.ค. 2564

1. รวบรวมข้อมูลกฎหมาย ให้เป็นระบบและเป็นเอกภาพ

พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. 2519/2534/2543/2545

พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522/2528/2530/2543/2545/2560/2562/2564

พ.ร.ก. ป้องกันการใช้สารระเหย
พ.ศ. 2533

พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก. ป้องกันการใช้สารระเหย
พ.ศ. 2542/2543/2550

พ.ร.บ. วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
พ.ศ. 2559

พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ. 2534/2543

ประกาศ คสช. + คำสั่ง คสช. ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

**พ.ร.บ. ให้ใช้ประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด พ.ศ. 2564**

**พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564**

ประเด็นสำคัญ ของกฎหมายยาเสพติดใหม่

1. รวบรวมข้อกำหนดให้เป็นระบบและเป็นเอกภาพ

2. มีคณะกรรมการที่ดูแลขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ อย่างเป็นระบบ

3. เปิดช่องนำยาเสพติดไปใช้ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย และเศรษฐกิจ

4. ปรับเปลี่ยนแนวทางการลงโทษผู้ทำผิดให้สมเหตุสมผลขึ้น
มุ่งเน้นปราบปรามผู้ค้า-ขบวนการค้ายา

5. มองผู้เสพเป็นผู้ป่วย เน้นแก้ปัญหาด้วยการบำบัด



โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ใน พรบ. นี้

- “เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.” หมายความว่า ผู้ซึ่งเลขาธิการ ป.ป.ส. แต่งตั้งโดยได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมการ ป.ป.ส. หรือจากคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการ ป.ป.ส. มอบหมาย เพื่อปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายนี้
- “พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมยาเสพติดตามภาคนี้

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และกำหนดอำนาจหน้าที่
เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำ
ของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง ทั้งหมด

- (๑) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- (๒) รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- (๓) ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
- (๔) สาธารณสุขนิเทศก์
- (๕) อธิบดีกรมการแพทย์
- (๖) รองอธิบดีกรมการแพทย์
- (๗) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- (๘) รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- (๙) อธิบดีกรมสุขภาพจิต
- (๑๐) รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
- (๑๑) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
- (๑๒) รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
- (๑๓) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- (๑๔) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์และการใช้ผลิตภัณฑ์

- (๒๓) ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- (๒๔) นิติกร สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- (๒๕) นิติกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- (๒๖) เกสัชกร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ข้อ ๒ ให้บุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เฉพาะในเขตจังหวัด/อำเภอ ที่ตนมีอำนาจหน้าที่ดูแลและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง ทั้งหมด

- (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร
- (๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
- (๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
- (๔) นายแพทย์ เกสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข และนิติกร ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- (๕) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐ
- (๖) เกสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิทยาศาสตร์ ของโรงพยาบาลของรัฐ
- (๗) สาธารณสุขอำเภอ
- (๘) นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ข้อ ๓ ให้บุคคลในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งดำรงตำแหน่ง
ต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง ทั้งหมด

- (๑) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- (๒) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- (๓) ผู้อำนวยการสำนักยาและวัตถุเสพติด กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ความผิดเกี่ยวกับการผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง หรือนำผ่านซึ่งยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์

มาตรา ๙๔ ห้ามผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย มีไว้ในครอบครอง หรือนำผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๓๕ (๕)

บทกำหนดโทษ

มาตรา ๑๔๙ ผู้ใดผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์


อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๙๔ ต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้

- (๑) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๑ ต้องระวางโทษจ าคคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
- (๒) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ ต้องระวางโทษจ าคคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท
- (๓) วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๓ หรือประเภท ๔ ต้องระวางโทษจ าคคุกไม่เกินห้าปี และปรับไม่เกินห้าแสนบาท



โดยมีข้อมูลจากชุมชน
ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม


พบการระบาดของ
clonazepam ในวัยรุ่น
ชุมชนลาดใหญ่
โดยยังขาดข้อมูลต้นทาง
แหล่งที่มาของวัตถุออก
ฤทธิ์




clonazepam เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4

Clonazepam (โคลนาซีแพม) หรือชื่อทางการค้า เช่น Convulsil , Prenarpil , Povanil , Clonaril , Ancoril และ Rivotril เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepines (เป็นโซไดอาเซพีน) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 4 ตาม พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ในทางการแพทย์ใช้เป็นยากันชัก (Anticonvulsant) ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคลมชัก ช่วยคลายกังวลสำหรับผู้ที่เป็นโรคตื่นตระหนก (Panic Disorder) และช่วยรักษาอาการผิดปกติของการเคลื่อนไหว (Akathisia)

<https://www.facebook.com/photo/?fbid=286630176621174&set=pcb.286631603287698>



ยาจะออกฤทธิ์ ยับยั้งการทำหน้าที่ของเซลล์ประสาท มีผลทำให้ผู้ใช้ยาลดอาการวิตกกังวลและตื่นตระหนกกลางได้ ช่วยคลายกล้ามเนื้อ ต้านอาการชัก ผลข้างเคียงจากการใช้ Clonazepam จะทำให้มีอาการง่วงซึม มึนศีรษะ สับสน จดจำสิ่งต่างๆ ไม่ได้ อาจทำให้เกิดอาการใจสั่นหรือมีชีพจรเต้นเร็วในผู้ใช้บางราย มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หายใจช้าลง หรือหายใจสั้นๆ หูแว่ว เห็นภาพหลอน มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวและการทรงตัว อาการไม่คงที่ เช่น ตื่นเต้นผิดปกติ พุดไม่หยุด โมโห โดยจะออกฤทธิ์นานประมาณ 8 ชั่วโมง ในผู้ใช้ยานี้หากพบว่ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที ทั้งนี้ หากมีการใช้ร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่น ๆ หรือใช้ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ จะทำให้เสริมฤทธิ์การกดระบบประสาท หายใจลำบาก และอาจเสียชีวิตได้



Clonazepam เป็นยาที่ต้องควบคุมการใช้ เนื่องจากอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือทำให้เกิดอาการติดยาได้หากไม่ระมัดระวังการใช้ หากมีการลักลอบจำหน่ายจะมีความผิดตามกฎหมาย การใช้ Clonazepam ในขนาดสูงเป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้เกิดการติดยาและติดยาได้ ถ้าหยุดใช้ยาทันทีจะเกิดอาการขาดยาหรือถอนยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว มือสั่น ชีพจรเร็ว เป็นโรคริต หรืออาจเกิดอาการชัก ทั้งนี้ Clonazepam สามารถละลายน้ำได้ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ทำให้ถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยนำไปใช้เพื่อหวังผลให้เกิดการมึนเมา หรือหมดสติ เป็นสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือเป็นสาเหตุของการเกิดความรุนแรงต่าง ๆ



สภยช. เตือน Clonazepam (โคลนาซีแพม)
ต้องใช้ตามแพทย์สั่ง ใช้ผิดเสี่ยงอันตราย
มีความผิดตามกฎหมาย

Clonazepam (โคลนาซีแพม) เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepines (เบนโซไดอาเซพีน)
เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 4

ใช้ทางการแพทย์

- ยาชัก (Anticonvulsant)
สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคลมชัก
- ช่วยคลายกังวล
สำหรับผู้ที่เป็โรคตื่นตระหนก
(Panic Disorder)
- ช่วยรักษาอาการผิดปกติ
ของการเคลื่อนไหว (Akathisia)



ผลข้างเคียงจากการใช้ Clonazepam

- มีอาการง่วงซึม
- มีศีรษะ สับสน จดจำสิ่งต่าง ๆ ไม่ได้
- อาจทำให้ใจสั่นหรือมีชีพจรเต้นเร็วในผู้ใช้อย่างไร
- กล้ามเนื้ออ่อนแรง
- หายใจช้าลง หรือหายใจสั้น ๆ
- หน้ามืด เห็นภาพหลอน
- มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวและการทรงตัว
- อารมณ์ไม่คงที่ เช่น ตื่นเต้นผิดปกติ พุดไม่หยุด โมโห
- หากพบว่ามีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์ทันที
- หากใช้ร่วมกับยาเสพติด หรือดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย
จะทำให้เสริมฤทธิ์การกดระบบประสาท และอาจเสียชีวิตได้

เตือน!!

กลุ่มผู้ไม่หวังดีนำ Clonazepam ไปใช้ในทางที่ผิด
โดยหวังผลให้เกิดการมึนเมา หรือหมดสติ
มีโทษทางกฎหมาย
เป็นสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
หรือเกิดความรุนแรงต่าง ๆ
ควรใช้ยา Clonazepam ภายใต้
การดูแลจากแพทย์เท่านั้น
หากมีการลักลอบจำหน่ายจะมีความผิดตามกฎหมาย

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบบร.)

ปรึกษาปัญหาและขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165

จัดทำโดย กลุ่มงานสารนิเทศ สืบเนื่องจาก บก สารเสพติดและโทษคดียาเสพติด สบบร. 11 เมษายน 65



สงวนลิขสิทธิ์ 2565

ชื่อและประเภทของ วัตถุออกฤทธิ์

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1

AB-CHMINACA
AB-PINACA
ADB-CHMINACA
ADB-FUBINACA
AM-2201
Cathinone
CUMYL-4CN-BINACA
Desoxypipradrol or 2-DPMP
DET
Didazepam
2-Diphenylmethylpyrrolidine or desoxy-D2PM
Diphenylprolinol or D2PM
DMHP
DMT
Ethylphenidate
Etryptamine
5F-ADB or 5F-MDMB-PINACA
5F-APINACA or 5F-AKB-48
5F-PB-22
FUB-AMB or MMB-FUBINACA or AMB-FUBINACA
GHB (gamma-hydroxybutyric acid)
JWH-018
JWH-073
MDMB-CHMICA
Mescaline and mescaline derivatives :
Escaline
Isoproscaline
Proscaline
3-Thiomescaline or 3-TE
3-Thiomescaline or 3-TM
3-Thiomescaline or 3-TME
4-Thiomescaline or 4-TE
4-Thiomescaline or 4-TM
4-Thioprosaline or 4-TP
Methacathinone
Methoxetamine (MXE)
4-methylaminorex
Parahexyl
para-Methyl-4-methylaminorex or
4,4'-dimethylaminorex or 4,4'-DMAR
PCE or eticyclidine
Phenazepam
PHP or PCPY or rolicyclidine
Psilocine or psilocin
Psilocybine
Sibutramine
TCP (tenocyclidine)
Tetrahydrocannabinol (THC) :
delta-6a(7)-THC
delta-6a(10a)-THC
delta-7-THC
delta-8-THC
delta-9(11)-THC
delta-10-THC
UR-144
XLR-11

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2

Alprazolam Amfepramone Amineptine Aminorex Brotizolam Buprenorphine Butorphanol Cathine or (+)-norpseudoephedrine Ephedrine Festadolam Fencamfamin Fenethylline Flunitrazepam Flurazepam Haloxazolam Ketamine Loprazolam Lorcaserin Lormetazepam Mazindol Mesocarb	Methylphenidate Midazolam N-Ethylamphetamine or etilamfetamine Nimetazepam Nitrazepam Pemoline PCP or phencyclidine Phendimetrazine Phenmetrazine Phentermine Phenylpropanolamine Pipradrol Pseudoephedrine Quazepam Secobarbital Temazepam Triazolam Zaleplon Zipeprol Zolpidem Zopidone
--	---

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3

Amobarbital Butalbital Cyclobarbitol Glutethimide	Meprobamate Pentazocine Pentobarbital
--	---

วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4

Allobarbitol Barbitol Benzphetamine or benzfetamine Bromazepam Butobarbital Camazepam Chloral hydrate and its adducts Chlordiazepoxide Chlorpheniramine Clobazam Clonazepam Clorazepate : Monopotassium salt Dipotassium of clorazepic acid Clotermine Clotiazepam Clonazepam Delorazepam Diazepam Ethchlorvynol Ethinamate Ethyl loflazepate Etizolam Fenproporex Fludiazepam	Halazepam Inorganic bromides (except : Lithium bromide, Potassium bromide technical grade, Sodium bromide technical grade) Ketazolam Lorazepam Medazepam Mefenorex Methypyrilol Methylphenobarbital Nordazepam Oxazepam Oxazolam Perlapine Phenobarbital Pinazepam Prazepam Propylhexedrine Pyrovalerone Secbutabarbitol SPA or lefetamine Tetrazepam Tofisopam Vinylbital
--	--

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ฉบับนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 พ.ศ. 2561 เรื่อง วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 4 พ.ศ. 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 พ.ศ. 2561



กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

สารความรู้(ทั้งหมด) - สำนักยาและวัตถุเสพติด

(อาคาร 2 และอาคาร 4) 88/7 ซอยบาราसनราดูร ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000


bdn.go.th

สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้

<https://website.bdn.go.th/th/knowledge/detail/qQScZUtk>


**รายชื่อยาเสพติด และวัตถุออกฤทธิ์
ที่วัยรุ่นมักนำมาเสพ ใช้ในทางที่ผิด**





Alprazolam (Xanax) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2

ยาอัลปราโซแลม (Alprazolam) คือ ยากลุ่มเบนโซไดอาซีปีน (Benzodiazepine) มีชื่อทางการค้าว่า โซแลม (zolam), ซาแนกซ์ (xanax) รูปร่างเป็นเม็ดรี มีขนาด 0.25 มิลลิกรัม, 0.5 มิลลิกรัม และ 1 มิลลิกรัม ตัวยาไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ในทางการแพทย์จะใช้สำหรับรักษาอาการวิตกกังวล อาการตื่นตระหนก เช่น โรคแพนิก รวมไปถึงโรคซึมเศร้า ในบางกรณีอาจใช้เพื่อช่วยให้นอนหลับ คลายกล้ามเนื้อ หรือต้านอาการชัก ซึ่งต้องใช้ยาภายใต้การดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น



Alprazolam (Xanax) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2

ยานี้มีฤทธิ์เร็วหลังจากรับประทานไปประมาณ 20-30 นาที และด้วยความที่ยามีฤทธิ์ต่อจิตและระบบประสาทส่วนกลางในสมอง ทำให้คนที่กินยามีอาการง่วงซึม ไปจนถึงหลงลืมและสูญเสียความทรงจำระยะสั้นชั่วคราว จึงถูกคนบางกลุ่มนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยนำยาไปผสมเครื่องดื่ม ทำให้ผู้เสียหายรู้สึกมึนงง เบลอ สูญเสียการทรงตัว ไม่ได้สติ หรือตื่นมาแล้วจำสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ เพื่อหวังรูดทรัพย์และล่วงละเมิดทางเพศ ดังที่ปรากฏเป็นข่าว



ยานอนหลับโดมิกุม

ยานอนหลับ

฿3,000.00 ฿3,500.00

ยอดขาย



ยานอนหลับ CLONAZEPAM

ยานอนหลับ

Clonazepam (โคลนาซีแพม) เป็นยาในกลุ่มเบนโซไดอะซีปีน (Benzodiazepine) ถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคแพนิค (Panic Disorder) ควบคุมอาการหรือรักษาโรคลมชักและช่วยบรรเทาความวิตกกังวล (Anxiety) นอกจากนี้ ยานี้อาจนำมาใช้เพื่อรักษาโรคหรืออาการอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ อย่างไรก็ตาม ยา Clonazepam มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาจึงควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกร

฿2,500.00 ฿2,990.00

หมวดหมู่: ยานอนหลับ

ป้ายกำกับ: CLONAZEPAM, ยานอนหลับ



ยานอนหลับโดมิกุมแบบน้ำ

ยานอนหลับ

฿3,000.00

midazolam (Dormicum) มิดาโซแลม เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2

midazolam หรือ dormicum เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 ต้องใช้ภายใต้การควบคุมของแพทย์ เป็นยาที่ออกฤทธิ์เร็ว คือเริ่มออกฤทธิ์ประมาณ 15 นาที หลังรับประทานยา สามารถละลายน้ำได้ดีทำให้มีการนำยานี้ไปละลายในเครื่องดื่มเพื่อให้ผู้เสียหายดื่มยาในขนาดต่ำจะช่วยลดความวิตกกังวล ขนาดสูงขึ้นจะทำให้นอนหลับ นอกจากนี้ยานี้มีผลข้างเคียง ทำให้ผู้ที่รับประทานสูญเสียความทรงจำไปชั่วคราว คือช่วงหลังรับประทานยาไปจนกระทั่งหลับ ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพนำผลข้างเคียงนี้มาใช้เพื่อทำให้ผู้เสียหายลืมสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อตื่นขึ้นมา และไม่สามารถติดตามผู้กระทำผิดมาลงโทษได้

ความสุขภาพ ยาหลับ Rohypnol

ยาหลับ

อันตรายที่ต้องรู้เท่าทัน!



Flunitrazepam ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม Benzodiazepines (BZD) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2

โรฮิปนอลเป็นยานอนหลับที่มีฤทธิ์เร็ว แรง และออกฤทธิ์ยาวนาน (มากกว่าระยะเวลาการนอนหลับในหนึ่งคืน) ทำให้เกิดผลข้างเคียงคือ มีอาการง่วงซึมในช่วงเวลากลางวัน และเพิ่มความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ โดยพบว่าโรฮิปนอลเป็นยานอนหลับที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงที่สุด เมื่อเทียบกับยาตัวอื่นซึ่งเป็นยานอนหลับด้วยกัน นอกจากนี้โรฮิปนอลยังมีผลต่อความทรงจำ จึงทำให้มีการออกข้อกำหนดให้มีการจำกัดยาใช้อย่างเคร่งครัด

เนื่องจากยาโรฮิปนอล มีฤทธิ์เป็นยานอนหลับที่แรง และมีผลต่อความทรงจำ และสร้างอันตรายต่อสังคมโดยรวมเป็นอย่างมาก ผู้ผลิตจึงคิดค้นวิธีป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด โดยการใส่สีฟ้าไว้ภายในเม็ดยา ทำให้เมื่อยาละลายในเครื่องดื่มจะเกิดสีฟ้าให้เห็นและสังเกตได้ ดังนั้นจากข่าวจึงพบว่าเมื่อวัยรุ่นนำมาใช้เสพด้วยการอมไว้ในปาก ทำให้สีที่ละลายออกมาเยิ้มติดที่ลิ้น เห็นเป็นลิ้นสีฟ้า

GHB หรือ gamma-Hydroxybutyric (แกมมา ไฮดรอกซี บูเทอริก) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 1

ในชื่อภาษาไทยเรา มักจะเรียกว่า “ยาเสียวสาว” หรือตอนนี้อาจจะต้องเพิ่มว่าเป็น “ยาเสียวหนุ่ม” ด้วย ยานี้มีผลออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาท ทำให้รู้สึกตื่นตัว รู้สึกสนุก รวมถึงการที่อยากมีเพศสัมพันธ์ด้วย ปัจจุบันพบการระบาดใช้ในสถานบันเทิงต่างๆ มากมาย

ในทางการแพทย์เราใช้ยานี้อยู่บ้างในการวางสลบ การผ่าตัด การทำคลอด รักษาโรคบางโรค เช่น โรคง่วงหลับ โรคพิษสุราเรื้อรัง มีการควบคุมการใช้ที่เข้มงวดโดยแพทย์ แต่ยานี้ถูกถอนออกจากบัญชียาตั้งแต่ปี 2533 แล้ว

ยา GHB มีทั้งชนิดเม็ด ชนิดผง หรือชนิดเหลว ที่นิยมใช้กันจะเป็นลักษณะเหลวใส เพราะใช้ง่าย มีรสเค็มเล็กน้อยกลมกลืนกับเครื่องดื่ม ในตลาดมืดจะเรียกว่า Liquid X หรือ Liquid E สามารถผสมกับเครื่องดื่มได้โดยที่เราไม่รู้ว่ามีส่วนผสมของยานี้อยู่

อาการเมื่อเราโดนยา GHB จะแตกต่างกันไปตามขนาดยาที่ได้รับ หากได้รับปริมาณมากๆ ก็มีสิทธิ์ที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้ ผลอาการจากยา GHB ที่พอจะสรุปได้ มีดังนี้

หากได้รับปริมาณยาไม่มาก ช่วง 5-10 นาทีแรก จะมีอาการมึนงง คลื่นไส้ อาเจียน เคลื่อนไหวลำบาก หากได้รับปริมาณยาขนาดสูง อาจทำให้เกิดการกดการทำงานของสมอง กดการทำงานของระบบหายใจ หดสติ หรือเกิดการเสียชีวิตได้ หากได้รับร่วมกับยาเสพติดอื่นๆ หรือแอลกอฮอล์ ก็จะทำให้เกิดผลเสียที่มากกว่าหลายเท่า



ยาปลุกเซ็กส์หญิง GHB

ราคา 2,200 บาท

สอบถามสายตรงโทร. 09-000-0000 (ทุกวัน)



Diazepam (Valium) ซึ่งเป็นยาในกลุ่ม Benzodiazepines (BZD)



“เคนมผง”

ด้วยอันตราย

ส่วนผสมหลัก

เคนตามีน

ไดอะซีแพม

ไอซ์

เฮโรइन

เคนตามีน (ketamine)

เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2

ผลข้างเคียง ออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรง เกิดอาการมึนเมา เพ้อคลั่ง มีความสุข เกิดภาพเหมือนฝัน รู้สึกเหมือนกำลังลอยอยู่ในอากาศ ร่างกายเคลื่อนไหวไม่ได้เหมือนเป็นอัมพาตชั่วคราว

ฤทธิ์ในระยะสั้น เกิดอาการหวาดระแวง จิตหลอน จำอะไรไม่ได้ หากใช้ติดต่อยาวนานมีปัญหาเกี่ยวกับการรับรู้และปัญหาทางจิต กลายเป็นคนวิกลจริต

โทษทางกฎหมาย เสพต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ครอบครอง ต้องระวางโทษจำคุก 1 - 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ไดอะซีแพม (Diazepam)

เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 4 ในทางการแพทย์ใช้เป็นยากล่อมประสาทหรือระงับประสาท

ผลข้างเคียง ง่วงซึม เหนื่อยล้า มึนงง ชีพจรช้า เห็นภาพหลอน กล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้อกระตุก กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

โทษทางกฎหมาย ลักลอบจำหน่ายต้องระวางโทษจำคุก 2-10 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000 - 1,000,000 บาท

ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การดูแล

- สังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหรือคนในครอบครัว
- หากพบมีพฤติกรรมเสี่ยงเข้าปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้รีบพูดคุยด้วยเหตุผลไม่ใช่ความรุนแรง
- หากพบว่าผู้ใช้ยาเสพติดมีอาการซึมลง แขนขาอ่อนแรง เรียกไม่รู้สึกตัว หายใจช้า หรือหมดสติ ให้รีบส่งพบแพทย์โดยเร็ว หรือ ติดต่อ สายด่วนศูนย์รับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน **1669**

การเสพ “ยาเคนมผง” ร่วมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มความเสี่ยงทำให้ผู้เสพเสียชีวิต และสามารถเกิดขึ้นได้แม้จะเสพเป็นครั้งแรก

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)
ปรึกษาปัญหาเรื่องยาและสารเสพติดได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ www.pmnidat.go.th

PMNIDAT

MELLOW38

mw5885

M

Follow

34 Following

13 Followers

13 Likes

แอดไลน์ครับ 🌟 mellow38

Line : mellow38

Videos

Liked

▶ 86

#เขี้ยวเหลือง

▶ 1

#คอนดรัก #กทม

▶ 118

#เมามาเมิด #ชลบุรี

▶ 5

#ยาคลายเครียด

▶ 8

#เขี้ยวเหลือง

▶ 178

#สายนั่งขิว

▶ 168

#ปริชลด

▶ 126

#เซสเปน

▶ 86

#เขี้ยวเหลือง

▶ 1

#คอนดรัก #กทม

▶ 118

#เมามาเมิด #ชลบุรี

▶ 5

#ยาคลายเครียด

▶ 8

#เขี้ยวเหลือง

▶ 178

#สายนั่งขิว

▶ 168

#ปริชลด

▶ 126

#เซสเปน

Get TikTok for desktop

Get TikTok App

ช่องทางการซื้อขาย จะใช้ social media ต่างๆ แล้วผู้ซื้อจะต้อง DM ไปยังผู้ขาย

ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุดิบใดๆ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเป็นลำดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง ซึ่งรวมถึงพืชหรือส่วนของพืชที่เป็นหรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษ หรืออาจใช้ผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษด้วย

แบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

- **ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1** ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน
- **ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2** ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอิน โคเดอีน ฝิ่นยา ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ในกรณีที่มีไว้จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองต้องได้รับอนุญาต
- **ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3** ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยา และมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ผสมอยู่ด้วย ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จำหน่าย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 เว้นแต่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ไม่ใช้บังคับกับผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือสาธารณสุขอื่น หรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือสภากาชาดไทย
- **ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4** สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น Acetic Anhydride ใช้ในการกลั่นผลิตเฮโรอีน, Anthranilic acid ใช้ในการกลั่นผลิต Methaqualone เป็นต้น
- **ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5** ยาเสพติดให้โทษที่ไม่เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึง 4 เช่น ฝิ่นฝิ่น เห็ดขี้ควาย สารสกัดกัญชา กัญชง*

ตารางแสดงการแบ่งประเภท ยาเสพติดให้โทษ / Table of Controlled Narcotic Drugs IN THAILAND						
ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 / Category I		ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 / Category II			ยาเสพติดให้โทษประเภท 4 / Category IV	
2CB (4-bromo-2,5 dimethoxyphenethylamine)	Ethylone	Acetyldihydrocodeine	Ecgonine	Opium	1-phenyl-2-propanone	Ergosine
2CD (2,5-dimethoxy-4-methylphenethylamine)	Eutylone	Acetylmethadol	Ethylmethylthiambutene	Oripavine	1-bac-4-AP	Ergosinine
2SB-NBOMe	Etorphine	Alfentanil	Ethylmorphine	Oxycodone	3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone	Ergotamine
2SC-NBOMe	Furanylfentanyl	Allylprodine	Etonitazene	Oxymorphone	3,4-MDP-2-P methyl glycidate (PMK glycidate)	Ergotaminine
2Si-NBOMe	Heroin	Alphacetylmethadol	Etixeridine	Pethidine		Ergothioneine
3-Methylfentanyl	isotonitazene	Alphameprodine	Fentanyl	Pethidine-Intermediate-A	3,4-MDP-2-P methyl glycidic acid (PMK glycidic acid)	Ethylidine Diacetate
3-Methylthiofentanyl	Ketobemidone	Alphamethadol	Furethidine	Pethidine-Intermediate-B		Isosafrole
4-chloro-2,5-dimethoxyamfetamine	Levamphetamine	Alphaprodine	Hydrocodone	Pethidine-Intermediate-C	4-anilino-N-phenethylpiperidine (ANPP)	Lysergamide
(4-chloro-2,5-dimethoxyamphetamine หรือ DOC)	Levomethamphetamine	Anileridine	Hydromorfinol	Phenadoxone		Lysergic Acid
	LSD	Benzethidine	Hydromorphone	Phenampromide	4-AP	methyl <i>alpha</i> -phenylacetoacetate (MAPA)
4-chloromethcathinone (clephedrone หรือ 4-CMC)	MDA	Benzylmorphine	Hydroxypethidine	Phenazocine	Acetic Anhydride	N-acetylanthranilic Acid
	MDMA	Betacetylmethadol	Isomethadone	Phenomorphan	Acetyl Chloride	N-phenethyl-4-piperidone (NPP)
4-fluoroamphetamine (4-FA)	Mecloqualone	Betameprodine	Levomethorphan	Phenoperidine	<i>alpha</i> - Ergocryptine	
4-fluoroisobutyrfentanyl (4-FIBF) , (pFIBF)	Mephedrone	Betamethadol	Levomoramide	Pholcodine	<i>alpha</i> - Ergocryptinine	Norfentanyl
4-MEC (4-Methylethcathinone)	Methiopropamine (MPA)	Betaprodine	Levophenacymorphan	Piminodine	<i>alpha</i> -phenylacetoacetamide (APAA)	Phenylacetic Acid
4-MTA (4-methylthioamphetamine)	Metonitazene	Bezitramide	Levorphanol	Piritramide		Piperonal
Acetorphine	MT-45	Clonitazene	Medicinal Opium	Proheptazine	<i>alpha</i> - Phenylacetoacetonitrile (APAAAN)	Safrole
Acetyl- <i>alpha</i> -Methylfentanyl	meta-Chlorophenylpiperazine (mCPP)	Coca bush	Metazocine	Properidine		
Acetylfentanyl	Methamphetamine	Cocaine	Methadone	Propiram	Anthranilic Acid	
Acryloylfentanyl (Acrylfentanyl)	Methaqualone	Codeine	Methadone Intermediate	Racemethorphan	<i>beta</i> - Ergocryptine	
AH-7921	Methoxyacetylfentanyl	Codoxime	Methyl-desorphine	Racemoramide	<i>beta</i> - Ergocryptinine	
<i>Alpha</i> -Methylfentanyl	Methylenedioxypropylvalerone (MDPV)	Concentrate of Poppy Straw	Methyldihydromorphine	Racemorphan	Elymodlavine	
<i>Alpha</i> -Methylthiofentanyl	Methylone		Metopon	Remifentanyl	Ergocornine	
<i>alpha</i> -pyrrolidinohexanophenone (<i>alpha</i> -PHP)	MMDA	Dextromoramide	Moramide-Intermediate	Sufentanyl	Ergocorninine	
<i>alpha</i> -Pyrrolidinovalerophenone (<i>alpha</i> -PVP)	MPPP	Dextropropoxyphene	Morpheridine	Tapentadol	Ergocristine	
Amphetamine	N-ethylhexedrone	Diampromide	Morphine	Thebicon	Ergocristinine	
	N - ethyl MDA / MDE	Diethylthiambutene	Morphine Methobromide	Thebaine	Ergometrine	
brorphine	N - hydroxy MDA / N-OH MDA	Difenoxin	Morphine N-Oxide	Tilidine	Ergometrinine	
<i>beta</i> -Hydroxy-3-methylfentanyl	N-ethylnorpentylone (Ephylone)	Dihydrocodeine	Myrophine	Trimepridine		
<i>beta</i> -Hydroxyfentanyl	Ocfentanyl	Dihydromorphine	Nicocodine			
Butylone	Orthofluorofentanyl	Dimenoxadol	Nicodicodine			
Butyrfentanyl	Parafluorobutyrylfentanyl	Dimepheptanol	Nicomorphine			
BZP (Benzylpiperazine)	para-Fluorofentanyl	Dimethylthiambutene	Noracymethadol			
Carfentanyl	Pentedrone	Dioxaphetylbutyrate	Norcodeine			
Chloephedrine	PEPAP	Diphenoxylate	Norlevorphanol			
Chlorpseudoephedrine	PMA	Dipipanone	Normethadone			
crotonylfentanyl	PMMA (Paramethoxymethamphetamine)	Drotebanol	Normorphine			
Cyclopropylfentanyl	STP / DOM		Norpipanone			
Desomorphine	Tetrahydrofuranylfentanyl (THF-F)					
Dexamphetamine	TFMPP (Trifluoromethylphenylpiperazine)					
Dihydroetorphine	Thiofentanyl					
Dimethoxyamphetamine	TMA					
Dimethylamphetamine	U-47700					
DOB	valeryl-fentanyl					
DOET						
					ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 / Category V	
					Extracts of Cannabis (genus Cannabis)*	
					<i>Papaver somiferum</i> หรือ <i>Papaver bracteatum</i>	
					<i>Psilocybe cubensis</i>	
					*Conditions prescribed in the Notification of the Ministry of Public Health, Specifying names and categories V of narcotics (B.E. 2565 (2022)) according to Narcotics Code.	
					*เงื่อนไขเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565	

Table of Controlled Narcotic Drugs under Narcotics Code B.E.2564 (2021)

ยาอี หรือ ยาเลิฟ (Ecstasy)



นิยมมากที่สุดในหมู่วัยรุ่นที่จัดปาร์ตี้ส่วนตัวที่ห้อง ที่เที่ยวกลางคืน กลุ่มวัยรุ่นที่มีฐานะนิยมมาก พกพาสะดวก มีสองรูปแบบ แบบแรกเป็นเม็ดขอบเรียบหรือมีรอย

ขีดแต่อีกด้านหนึ่งจะพิมพ์รูปดอกไม้ สัตว์ต่างๆ หรือ ตัวอักษร เรียกว่า “Kitty” หรือ “Kitty Flipping” อีกรูปแบบจะเป็นผงเรียกว่า “Molly” ซึ่งนิยมน้อยกว่า วัยรุ่นจะเข้าใจเอาเองว่าปลอดภัยกว่า ยาบ้าหรือไอซ์ แต่หาู้ไม่ว่าออกฤทธิ์รุนแรงกว่าด้วยซ้ำไป กินง่าย ราคาไม่แรง วัยรุ่นจะบอกต่อกันมาว่าให้จัดคนละหนึ่งเม็ดไม่เกินไป มากกว่านี้อาจเสียชีวิต ไม่นิยมเอาไปผสมเหล้า วัยรุ่นเรียกว่า “หนม” ยาจะออกฤทธิ์ภายใน 30-45 นาที ทำให้เกิดความเคลิบเคลิ้ม ล่องลอย แต่ไม่หัวเราะ กระตุ้นความไวต่อการสัมผัสและอารมณ์ทางเพศ อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้น ร้อนง่าย มีโอกาสเกิดภาวะ Hyperthermia กระตุ้นให้เกิดภาวะขาดน้ำ คอแห้ง ยา

ออกฤทธิ์ยาวนาน 3-6 ชั่วโมง เพียงพอสำหรับการมีความสุขตลอดคืน ยาเป็นอนุพันธ์ของ ยาบ้า 3,4 methylenedioxy methamphetamine (MDMA) หรือ 3,4-Methylenedioxy amphetamine (MDA) จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 ออกฤทธิ์ทั้งกระตุ้นและหลอนประสาทในเวลาเดียวกัน กระตุ้นการหลั่ง NE, Dopamine และ Serotonin ใน CNS และ ANS มีผลทั้ง Hyper- และ Hypotensive effect, vasoconstriction ในระดับยาที่สูงสามารถทำให้เกิด coronary vasospasm, myocardial ischemia (demand-supply mismatch) และ arrhythmia แม้ในคนปกติที่ไม่มีโรคหัวใจ

เคตามีน (Ketamine)

หรือ **ยาเค**

จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
เป็นกลุ่มยาเสพติด รักษาอาการปวดเรื้อรัง ระงับประสาทในผู้ป่วยหนัก หากใช้ในปริมาณมาก
จะหลอนประสาทอย่างรุนแรง หูแว่ว กลายเป็นคนวิกลจริตได้



สำนักงาน ป.ป.ส.
กระทรวงยุติธรรม

ผลข้างเคียง

เกิดอาการประสาทหลอน ง่วงซึม
ส่งผลกระทบต่อระบบหัวใจ
ระบบทางเดินปัสสาวะ
หากใช้ในปริมาณมาก ทำให้กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

ความผิดทางกฎหมาย

ผู้ขาย มีโทษ จำคุก 4 - 20 ปี และปรับตั้งแต่ 400,000 - 2,000,000 บาท
มีไว้ในครอบครอง มีโทษ จำคุกไม่เกิน 1 - 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ

ยาเค หรือ ยามอมสาว (Ketamine)

นี่คือยาเสพติดในการมอมสาว วัยรุ่นเรียกว่า “เค” “น้ำ” “ตบแป้ง” ผลออกมา
ในรูปของผงสีขาว ใช้สูดดม หรือ ใช้น้ำ ฉีดเข้าเส้นเลือด ทั้งผงและน้ำสามารถเอา
มาผสมในเครื่องดื่ม สาวๆเวลาไปเที่ยวกลางคืนต้องระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมาก
อาจต้องถือเครื่องดื่มไว้กับตัวตลอดเวลา ถ้าผู้ชายจะลากเราไปฟันจะผสมเคตอน
ที่เราเพลอ แตกต่างจากยาอี เคจะออกฤทธิ์เร็วมาก ผู้เสพจะเหมือนวิญญานถูก
กระชากออกจากร่าง เกิดภาพฝัน หลอน ล่องลอยในอากาศ ร่างกายขยับไม่ได้
ตามสมองสั่ง ไม่สามารถขัดขืนได้ทั้งๆที่เห็นอยู่ว่าโดนผู้ชายจุ่มออกมา อยากจะ
ตะโกนให้คนช่วยก็ทำไม่ได้ ยาออกฤทธิ์เร็ว แต่อยู่ได้ไม่นานไม่เกิน 1 ชั่วโมงก็หมด
ฤทธิ์ แต่กว่าจะฟื้นอาการต้องรอนานถึง 24 ชั่วโมง ที่สำคัญจะทำให้สูญเสียความ
ทรงจำระยะสั้นไป ช่วงที่โดนยาจนตื่นอาจจะเลือนรางจำเหตุการณ์ไม่ได้ทั้งหมด ไม่
ทำให้ปาร์ตี้สนุกเหมือนยาอี จึงนิยมใช้เพื่่อมอมสาวไปฟัน

Ketamine เป็นยาเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ก่อนผ่าตัด รูปแบบยาจริงเป็น
ของเหลว จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 กลุ่มที่ลักลอบเอา Ketamine มาใช้
อาจทำให้ระเหยและเปลี่ยนยาเป็นรูปผง Ketamine กระตุ้น [Ca] influx เป็น
direct myocardial stimulant ให้ผลทั้ง positive inotropic และ
chronotropic effect กระตุ้นให้เกิด arrhythmia ได้โดยเฉพาะกลไกที่เป็น
cAMP-mediated ทั้งหมด ถึง BP ให้สูงขึ้นได้มากๆ

ไอซ์ (Methamphetamine)



วัยรุ่นนิยมเรียกว่า “ไอซ์” หรือ “เก็ต หรือ สเก็ต” เนื่องจากมีรูปร่างเป็นก้อนผลึกใสเหมือนน้ำแข็ง เสพด้วยการเผาไฟ และสูดดมที่ระเหิดขึ้นมาซึ่งไม่มีกลิ่น แตกต่างจากการเอายาบ้าไปลนไฟซึ่งจะมีกลิ่น ไอซ์อยู่ในกลุ่มเดียวกับยาอี แต่แตกต่างกันที่ ไอซ์จะกระตุ้นอย่างเดียวไม่หลอนเหมือนอี วัยรุ่นจะรู้สึกหึกเหิม ตัด มั่นใจในตัวเอง กำาร้าว อยู่นิ่งไม่ได้ เพิ่มความต้องการทางเพศ ในปริมาณที่สูงจะกระตุ้นให้ ความดันโลหิตพุ่งสูง หัวใจเต้นเร็ว เต้นผิดปกติ หวหะ ชักเกร็งได้ ไอซ์ถือว่าเป็นยาเสพติดที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่ง ใช้ใน วงแคบ ต้องมีช่องทางในการหาขายมา ราคาค่อนข้างสูง จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ระบุยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕
พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายยาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยาเสพติดให้โทษที่ระบุชื่อต่อไปนี้ เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

(๑) พืชฝิ่น พืชซึ่งมีชื่อพฤกษศาสตร์ว่า *Papaver somniferum* L. และ *Papaver bracteatum* Lindl. หรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้ฝิ่นหรือแอลคาลอยด์ของฝิ่น

(๒) เห็ดขี้ควายหรือพืชเห็ดขี้ควาย ซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Psilocybe cubensis* (Earle) Singer หรือที่มีชื่ออื่นในสกุลเดียวกันที่ให้สาร psilocybin หรือ psilocin

(๓) สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ซึ่งเป็นพืชในสกุล *Cannabis* ยกเว้น สารสกัดดังต่อไปนี้

(ก) สารสกัดที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ำหนัก เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชงที่ปลูก ภายในประเทศ

(ข) สารสกัดจากเมล็ดของพืชกัญชาหรือกัญชง ที่ได้จากการปลูกภายในประเทศ

ข้อ ๒ กรณียาเสพติดให้โทษตามข้อ ๑ ที่เป็นสารควบคุมคุณภาพในการตรวจวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพของการตรวจสารเสพติดในร่างกาย ซึ่งเป็นเครื่องมือแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วย เครื่องมือแพทย์ และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือแพทย์นั้น ให้ยกเว้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ ในประเภท ๕

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

อนุทิน ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ระบุยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5
พ.ศ. 2565

- พืชฝิ่น
- เห็ดขี้ควาย
- สารสกัดจากทุกส่วนของกัญชาหรือกัญชง

ยกเว้น

- สารสกัดที่มี $THC < 0.2 \%$ ที่ได้รับ อนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชา กัญชงที่ปลูกในประเทศ
- สารสกัดจากเมล็ดกัญชา กัญชงที่ได้รับ การปลูกในประเทศ



อัปเดต!! สารสำคัญ พสบ.พืชกระท่อม 2565

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม



การกำกับควบคุมเกี่ยวกับขออนุญาต



การเพาะปลูกกระท่อม
สามารถทำได้เสรี ไม่ต้องขออนุญาต



การครอบครองและการขาย
ใบกระท่อมโดยตรง
สามารถทำได้โดย ไม่ต้องขออนุญาต



การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร
ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง
ให้ขออนุญาตโดยใช้กฎหมายเฉพาะของ
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ



การนำเข้าและส่งออกใบกระท่อม
ต้องได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ
ป.ป.ส.

ฝ่าฝืนนำเข้าหรือส่งออกโดยไม่ได้รับอนุญาต
จำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท



ผู้ขอรับอนุญาตนำเข้าส่งออก ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
ไม่เคยถูกเพิกถอนหรือพักใช้ใบอนุญาต
กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย

5 ข้อห้ามตาม พรบ.พืชกระท่อม

การคุ้มครองอันตรายจากการบริโภคกระท่อม

1. ห้ามขาย ใบหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของใบกระท่อมแก่บุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง



ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี



สตรีมีครรภ์




สตรีให้นมบุตร

ฝ่าฝืนขายให้แก่บุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง ปรับ 3 หมื่นบาท


2. ห้ามขาย ใบบางสถานที่และวิธีการ



ห้ามขายใบสถานศึกษา



หอพัก



สวนสาธารณะ
สวนสัตว์ สวนสนุก



ห้ามขายโดยใช้เครื่องขาย

ฝ่าฝืนขายใบบางสถานที่และวิธีการที่ห้ามขาย ปรับ 5 หมื่นบาท



ผู้ขาย มีหน้าที่ต้องปิดประกาศหรือแจ้ง ณ สถานที่ขายให้ทราบถึงข้อห้ามขายแก่บุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง

ผู้ขาย มีหน้าที่ต้องปิดประกาศหรือแจ้ง ณ สถานที่ขายให้ทราบถึงข้อห้ามขายแก่บุคคลที่กฎหมายคุ้มครอง

ร้านนี้มี ใบกระท่อมจำหน่าย



หากลูกค้าอายุน้อยกว่า **18 ปี** หรือเป็นสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรโปรดแจ้ง เนื่องจากไม่สามารถจำหน่ายให้ได้


5 ข้อห้ามตาม พรบ.พืชกระท่อม

การป้องกันการใช้กระท่อมในทางที่ผิด



3. ห้ามโฆษณา เพื่อจูงใจให้บริโภคใบกระท่อมหรือน้ำต้มใบกระท่อมที่ผสมกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

ฝ่าฝืนข้อห้ามการโฆษณา จำคุก 2 ปี ปรับ 2 แสนบาท



4. ห้ามบริโภค ใบกระท่อมหรือน้ำต้มใบกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษ หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

ฝ่าฝืนข้อห้ามการบริโภค ปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท

5. ห้ามจูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม ให้อบายหลอกลวง บู่เข็ญ ใช้อำนาจครอบงำ ผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีขื่นใจเพื่อให้ผู้อื่นบริโภคใบกระท่อมหรือน้ำต้มใบกระท่อมที่ผสมกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

จูงใจ ส่งเสริม บู่เข็ญ ให้ผู้อื่นฝ่าฝืนข้อห้าม จำคุก 1 ปี ปรับ 1 แสนบาท


พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบ.พืชกระท่อม

"พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่

1. เข้าไปในสถานที่นำเข้าหรือส่งออกหรือยานพาหนะเพื่อตรวจสอบหรือควบคุม
2. เรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำหรือเอกสารหลักฐาน





อย.เรียนคินยาลดความดันเอบีซาแทนบางรุ่น ที่พบการปนเปื้อนสารที่อาจก่อมะเร็ง

