


## การทดสอบสารสเตียรอยด์

### ขั้นตอนการทดสอบสารสเตียรอยด์

1. บดยาที่ต้องการทดสอบให้ละเอียด
2. ตักของยาใส่หลอดทดลองให้ถึงขีดล่าง (ลีน้ำเงิน)
3. เทสารละลายตามลงไปในหลอดทดลองให้ถึงขีดบน (ลีดแดง)
4. ปิดฝาให้สนิทแล้วเขย่าประมาณ 3 นาที
5. ตั้งทิ่งไว้ รอจนกว่าสารจะเกิดการแยกชั้น
6. เปิดจากปากแล้วใช้หลอดดูด ดูดสารละลาย ส่วนในลิขินมา
7. เปิดซองชุดทดสอบแล้วหยดสารลงไปในแนว ตั้งตระหง่าน 4 หยด
8. ทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที และอ่านผล



วิธีอ่านผลทดสอบ

อ้างอิง: กรมวิชาศาสตร์การแพทย์

มักพบสารสเตียรอยด์ใน....

### ยาลูกกลอน



### ยาแมง



### ยาอัดเม็ด



สำนักงานสาธารณสุขสู่บูรพา และแท้จริงอย่าง  
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บังคับใช้ และการสื่อสารฯ

สเตียรอยด์  
ภัยร้ายใกล้ตัว



## สารสเตียรอยด์

### สารกลุ่มสเตียรอยด์

สารสเตียรอยด์ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการต่อต้านการอักเสบ และลดภูมิคุ้มกันเนื่องจากประโยชน์ดังกล่าวของสารสเตียรอยด์ทำให้ปัจจุบันมีการนำสารสเตียรอยด์ไปใช้ในกระบวนการรักษาอย่างไม่ถูกต้อง หรือนำไปเป็นส่วนประกอบในยาแผนโบราณต่างๆ จนเกิดอันตราย

### อันตรายจากสารสเตียรอยด์

#### ใช้ที่ผิวนอก

- ผิวนังบาง
- ผิวนแฟ็ಡ สิวเห่อ




#### ใช้ยอดตา

- เกิดต้อหิน
- ตาติดเชื้อช้ำ อาจทำให้ตาบอด



#### ใช้รับประทาน

- เกิดแผลในกระเพาะอาหาร
- หน้าบวม อ้วนขึ้น
- อาการมณฑะปอร์ปราน
- ความดันโลหิตสูง
- กระดูกพรุน
- อ้วนแพลีย กล้ามเนื้อแข็งชาอ่อนแรง



จะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้มีสารปนเปื้อนปนหรือไม่

## HOW TO...


หลักเลี้ยงจากการสเตียรอยด์

### อย่าซื้อ



1. ยาชุด ยาลูกกลอน/ยาแผนโบราณ ที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยาจากกรมฯ วัด หรือตามตลาดนัด เพราะอาจได้รับ ผลิตภัณฑ์ลักลอบใส่สารสเตียรอยด์
2. ผลิตภัณฑ์ตามคำโฆษณาชวนเชื่อว่าสามารถรักษาโรคได้ครอบจักรวาล และหายขาดทันใจ

### หาก....



- พบรหินอาการที่สงสัยว่าอาจเกิดจากการใช้ยาที่ผสมสารสเตียรอยด์ เช่น หน้ากลมอุญ คล้ายพระจันทร์ มีไขมันสะสมหลังคอเห็นอกรากดูไฟปลาร้า ผิวนาง มีจ้ำเลือด มีรอยแตกตามผิว ให้รีบนำยาที่ร้านมาปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกรใกล้บ้านทันที

### กรณี....

- มีใบสั่งยาจากแพทย์ ควรนำไปสั่งยาไปชื้อยา และรับคำปรึกษาจากเภสัชกรในร้านขายยาที่มีใบอนุญาตขายยา หรือจากร้านยาคุณภาพเท่านั้น



"หากสงสัยว่ากำลังใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสเตียรอยด์ และมีการใช้ติดต่อภายนอก 3 เดือน ไม่ควรหยุดใช้อย่างกะทันหัน เอง เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ควรนำไปพบแพทย์พร้อมนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ตนเองใช้ไปด้วย เพื่อที่แพทย์จะได้ทำการรักษาอย่างถูกต้อง"

